

Непорекс® 2 SG
листівка-вкладка

Опис

Водорозчинні гранули.

Склад

100 г препарату містять:

діючу речовину циромазин – 2 г.

Допоміжні речовини: поліетиленгліколь, вода, сечовина.

Фармакологічні властивості

ATC vet QP53F, інсектициди.

Непорекс® 2 SG – інсектицидний препарат, діючою речовиною якого є циромазин (2-циклопропіламіно-4,6-діаміно-s-триазину), ефективний проти личинок двокрилих комах *Musca spp.*, *Drosophila spp.*, *Stomoxys calcitrans*, *Lucilia spp.* у гної та інших місцях розмноження мух.

Циромазин є регулятором росту личинок мух та інших комах, впливає на метаболізм хітину у період линьки личинок. Циромазин в організмі личинок гальмує розвиток кутикули, внаслідок чого припиняється ріст личинок, які розвиваються у вологому середовищі (у гної, посліді, ферментуючих залишках кормів тощо), що призводить до їх загибелі.

Циромазин діє на личинки комах лише на певній стадії розвитку. У рекомендованих концентраціях він є найбільш ефективним на стадії першої линьки личинок двокрилих комах та має значно слабшу дію на інших стадіях розвитку личинок. Крім того, його дія обмежується на личинки двокрилих комах і не розповсюджується на інші комахи, які розмножуються у тому ж середовищі.

Циромазин перериває цикл розвитку мух у період линьки від I-ої до II-ої стадії. Рекомендується раннє застосування препарату так, як личинки II-ої та III-ої стадії, незважаючи на обробку, продовжують розвиватися, що в відстрочує видимий ефект препарату.

Залежно від часу обробки, вплив препарату Непорекс® 2 SG на чисельність популяції дорослих мух стає помітним через 1-2 тижні після застосування препарату. Для знищення популяції дорослих мух рекомендується одночасно застосовувати інсектициди проти дорослих комах.

Застосування

Непорекс® 2 SG застосовується для обробки тваринницьких приміщень (корівники, свинарники, пташники) для знищення личинок двокрилих комах: *Musca spp.*, *Drosophila spp.*, *Stomoxys calcitrans*, *Lucilia spp.*

Дозування

Препарат Непорекс® 2 SG є водорозчинними гранулами, який можна застосовувати у сухому виді, а також методом обприскування та поливу. Рекомендована доза становить 0,5 г активної речовини на м² площі, яка обробляється, що забезпечує 5 проміле (ppm) на 10 см середовища, в якому розмножуються мухи. Доза препарату не залежить від способу застосування.

Рекомендовані дози:

Препарат	Спосіб застосування	Доза, г препарату; г препарату/л води	Площа застосування, м²
Непорекс® 2 SG	Розкидання у сухому виді	500	20
	Обприскування	500/5	20
	Полив	500/15	20

Перед застосуванням препарату визначаються місця розмноження мух. Усі встановлені місця необхідно обробляти одночасно. Зовнішні купи гною та відстійники складають потенційні місця розмноження мух і повинні бути обробленими.

Личинки мух також можуть знаходитися у вологих місцях навколо годівниць і поїлок, а також в інших місцях тваринницьких приміщень (стіни, підлоги, стовпи, стійки, підпорки тощо).

Непорекс[®] 2 SG не має ефективної дії щодо дорослих мух. Знищення популяцій дорослих мух здійснюється поступово і стає помітним через 1-2- тижні після застосування препарату. Для швидкого зниження популяції дорослих мух рекомендується одночасно застосовувати спеціальні інсектициди проти дорослих комах.

Способи застосування

Розкидання у сухому виді: Рівномірно нанести визначену кількість препарату Непорекс[®] 2 SG безпосередньо у місця розмноження мух. Застосовувати препарат у сухому виді лише на вологий чи мокрий гній.

Обприскування: Розчинити визначену кількість препарату Непорекс[®] 2 SG у відповідному об'ємі води. Отриманий розчин нанести на місця розмноження мух за допомогою ранцевого обприскувача або іншого автоматичного обприскувача.

Полив: Розчинити визначену кількість препарату Непорекс[®] 2 SG у відповідному об'ємі води. Рівномірно нанести розчин у місця розмноження мух за допомогою поливної лійки.

Увага: Непорекс[®] 2 SG наносять безпосередньо у місця розмноження мух. Препарат неефективний проти дорослих комах, і тому не призначений для нанесення на місця посадки мух (стіни, стеля тощо).

Періодичність застосування: Періодичність застосування залежить від систем догляду та утримання тварин у приміщенні, а також від кліматичних умов. Рекомендована періодичність становить від 2 - 3 тижнів до декількох місяців.

Схеми застосування у різних тваринницьких приміщеннях

Корівник

Глибока підстилка: Нанести препарат смугою шириною приблизно 50 см вздовж стін, навколо обладнання та під ним, де підстилка неутрамбована тваринами; обробити краї годівниць і поїлок та місця, у які висипається з годівниць корм чи розливається з поїлок вода, а також місця нагромадження гною.

Зовнішні загоны для телят: Нанести препарат на всю поверхню.

Непорекс[®] 2 SG застосовується методом обприскування або поливу приблизно через 3 доби після вичищення від гною та повторюється після кожного вичищення або при виявленні личинок мух.

Загоны із щільною підлогою: Нанести препарат на всю поверхню підлоги відразу після вичищення від гною. Повторювати обробку після кожного вичищення або при виявленні личинок мух.

Свинарник

Щільна підлога: Нанести препарат на всю поверхню підлоги відразу після вичищення від гною. Повторювати обробку після кожного вичищення або при виявленні личинок мух.

Система «пусто-зайнято»: Застосовувати препарат Непорекс[®] 2 SG відразу після вичищення та перед запуском свиней.

Глибока підстилка: Застосовувати препарат Непорекс[®] 2 SG шляхом обприскування чи поливу через 3 доби після вичищення від гною та після кожного наступного вичищення та при виявленні личинок мух. Обробляються повністю поверхні куп гною та вологі ділянки навколо годівниць та поїлок.

Пташник

Застосовувати препарат Непорекс® 2 SG на всій поверхні куп гною приблизно через тиждень після вичищення пташників від гною. Повторювати обробку після кожного вичищення або при виявленні личинок мух.

Інші сільськогосподарські об'єкти

Як правило, Непорекс® 2 SG застосовують у місцях розмноження мух через 1-3 доби після нагромадження матеріалу, який сприяє розмноженню комах. Наступна обробка проводиться через 2 тижні після першої.

Протипоказання

Немає.

Застереження

При роботі з препаратом Непорекс® 2 SG необхідно дотримуватися загальних правил гігієни і безпеки, що прийняті при роботі з ветеринарними препаратами.

Запобігати потраплянню препарату до годівниць та поїлок.

Уникати контакту тварин та птиці з препаратом.

Уникати прямого контакту препарату зі шкірою, слизовими оболонками та одягом.

Уникати попадання препарату в очі, у травний канал та органи дихання.

При роботі з препаратом користуватися захисним одягом та захисними рукавицями.

Не можна приймати їжу, пити, курити під час роботи з препаратом.

Після роботи необхідно ретельно вимити руки та передягнути одяг.

У випадку поганого самопочуття необхідно негайно припинити роботу з препаратом та звернутися до лікаря.

Специфічний антидот невідомий; рекомендується симптоматичне лікування.

Форма випуску

Контейнери із поліетилену високої щільності по 5 кг.

Зберігання

Зберігати в оригінальному щільно закритому упакованні, у недоступному для дітей та тварин місці. Зберігати окремо від кормів, харчових продуктів та біодобавок. Зберігати у сухому, захищеному від світла місці.

Термін придатності - 5 років.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення:

Новартіс Енімал Хелс, д. о. о.,
Веровшкова 57, СЛ - 1000 Любляна,
Словенія

Novartis Animal Health, d. o. o.,
Verovskova 57, SI - 1000 Ljubljana,
Slovenia

Виробник готового продукту:

Ширм АГ, Дивізион Сифокан,
Дизельштрассе 8,
D-85107, Бар-Ебенхаузен,
Німеччина

Schirm AG, Division Sifokan,
Dieselstrasse 8,
D-85107 Baar-Ebenhausen,
Germany